

Kolorektális elváltozások sebészeti kezelése COVID-19 járvány ideje alatt

- I. fázis: (kórházi kapacitás nem kimerült, ITO-s lélegeztetési kapacitás megvan, ill. nincs gyors eszkalációs fázisban a járvány. Amikor a beteg maradandó egészségügyi károsodást szenved, ha nem kerül 3 hónapon belül ellátásra)

Mihamarabbi sebészeti ellátás javasolt:

- szűkítő rektum, vagy kolon tumor
- gyakori transfúziót igénylő tumorok
- tünetmentes kolon tumorok
- rectum tumorok neoadjuvans kezelés utáni optimális időablakban
- lokális perforáció, vagy szepszis kialakulásának lehetősége
- korai rektum tumor, ahol adjuvans kezelés nem jön szóba

Halasztható (3 hónap):

- profilaktikus indikáció (herediter betegségek)
- benignus tünetmentes polypok
- kis, tünetmentes kolon, vagy rektum carcinoid (grade 1)

Alternatív kezelések, melyek halaszthatják a sebészeti kezelést:

- lokálisan előrehaladott kolon tumor: neoadjuvans th. 2-3 hónapig, majd műtét
- rektum tumorok, ahol egyértelmű, korai regresszió a neoadjuvans CRT-ra (további várakozási idő biztonságos, vagy kiegészítő kemoth. adható)
- lokálisan előrehaladott, vagy recidív rektum tumorok, ahol exenteráció javasolt (kiegészítő kemoth. szóba jön)
- Oligometasztatikus betegség (hatékony szisztémás kezelés elérhető)

- II. fázis: (sok COVID 19, vagy gyanús beteg, korlátozott lélegeztetőgép kapacitás, gyors eszkalációs fázisban a járvány)

Csak sürgős esetek:

- szűkítő kolon tumor és a sztent nem elérhető
- szűkítő rektum tumor (sztómaképzés)
- gyakori transfúziós igény, mely kórházi ellátást igényel
- lokális perforáció és szepszis erős gyanúja

Halasztható:

- minden egyéb

Alternatíva:

- beteg átszállítása megfelelő kapacitással bíró kórházba
- neoadjuvans th. kolon, ill. rektum tumor esetén
- sztentelés, ha elérhető

III. fázis: (kórházi kapacitás megtelt, nincs szabad lélegeztetőgép kapacitás)

- perforált, obstrukciót okozó, aktívan vérző tumorok
- szepszis

Alternatíva:

- beteg átszállítása megfelelő kapacitással bíró kórházba
- sztóma
- kemoterápia
- radioterápia

Amennyiben a beteg állapota lehetővé teszi, minden döntés onko-teamen történjen meg, megfelelően dokumentáltan.

Referencia: COVID-19: Elective Case Triage Guidelines for Surgical Care – American College of Surgeons